

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第②类医药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

生理痛专用药 **エルペイン** コウワ  
L-PAIN KOWA

使用上的注意事项

禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

- 以下人士禁止服用  
(1) 对本药品或者本药品成分过敏者。  
(2) 有服用本药品或者解热镇痛药、感冒药引起哮喘的患者。  
(3) 未满15岁的儿童。  
(4) 距预产期12周以内的孕妇。  
(5) 经诊断有以下疾病者。青光眼
- 在服用本药品期间，请不要服用以下任何一种医药品  
解热镇痛药、感冒药、镇静药、肠胃镇痛解痉药、含有莨菪浸膏的胃肠药、晕车药
- 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具  
(可能会出现视觉模糊、异常眩晕等症状。)
- 服用前后请勿饮酒
- 请勿长期连续使用

咨询相关事项

- 以下人士服用前请先咨询医生、牙科医生、药剂师或者“登録販売者”  
(1) 正接受医生或者牙科医生治疗者。  
(2) 孕妇或者可能妊娠的妇女。  
(3) 哺乳期妇女。  
(4) 对药品等过敏者。  
(5) 有以下症状者。排尿困难  
(6) 经诊断有以下疾病者。  
心脏病、肾病、肝病、全身性红斑狼疮、混合性结合组织病  
(7) 患有下列疾病的患者。胃溃疡・十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、节段性回肠炎
- 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒、淤青
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振、胃部不舒服、胃痛、口腔炎、烧心、胃胀、肠胃出血、腹痛、腹泻、血便
精神神经系统	头晕、头痛
循环系统	心悸
呼吸系统	气喘
泌尿系统	排尿困难
其他	视觉模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、出血难止、出血、脊背疼痛、体温过度下降、体乏无力、异常眩晕、潮热

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后，立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

(连接背面)

皮肤黏膜眼症候群 (史蒂文斯·约翰逊综合征)、 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼充血、眼眵、嘴唇溃烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹·发红等持续、 急剧恶化。
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、出疹、黄疸(皮肤及眼白发黄)、褐色尿、全身乏力、 食欲不振等症状。
肾障碍	出现发热、出疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛(许多关节疼痛)、 腹泻等症状。
无细菌性髓膜炎	出现伴随脖颈支撑的剧烈头痛、发热、恶心·呕吐等症状。 (此类症状, 特别多见于接受全身性红斑狼疮、混合性结合组织病治疗的患者。)
哮喘	呼吸时, 出现气喘吁吁、呼吸困难等症状。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发热、皮肤或者粘膜苍白、疲劳感、心悸、气喘、 恶心突然感到眩晕、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突然高烧、发冷、喉咙疼痛等症状。

- ③服用后, 可能会出现下列症状, 当下列症状持续或者有增强迹象时, 应停止服用, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者” 便秘、口干
- ④当服用5~6次仍不见症状好转时应停止服用, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”  
(存在因某种子宫疾病引发生理痛的可能性。)

## 效能·效果

生理痛(主要为伴随软便的小腹疼痛)

## 用法·用量

按照下列剂量, 尽量避免空腹服用, 以常温水或者温开水服用。

服用间隔时间应在4小时以上。

年龄	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	1片①	限用3次
未满15岁的儿童	✕不可服用	



### <用法·用量相关注意事项>

①请务必严格遵守用法·用量。②药片的取出方法: 如上图所示用指尖强压装有药片的PTP薄膜的突起部, 弄破背面的铝箔, 然后取出服用。(错误直接服用可能会引发刺伤食道粘膜等意外事故。)

## 成分·分量(1片装)

●布洛芬 150.0mg ●溴丁东莨菪碱 10.0mg

(添加物)乳糖、羟丙基纤维素(HPC)、羟丙甲纤维素、无水硅酸、交联羧甲基纤维素Na、滑石、三乙酸甘油、氧化钛、氧化铁、巴西棕榈蜡

## 保管及使用上的注意事项

①请放在干燥阴凉的地方保管, 避免高温及阳光直射。②请放在儿童无法触及的地方。③请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。) ④注意保管及携带, 避免PTP铝箔损坏、药片破损。⑤请勿服用过期(外盒记载)药品。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14

Y1884R K8K